

教えて!!



発行・監修：  
長野県 新型コロナウイルス  
ワクチン接種アドバイザーチーム  
(2021.6 発行)  
接種は無料（公費負担）

モデルナ  
社製ワクチン  
ver.

# 新型コロナワイルスワクチン

どんな流れ？

効果は？

副反応は？

こんな場合接種できるの？



こんな人は接種できません

- 他のワクチンを2週間以内に接種
- 明らかに発熱（37.5℃以上）
- 重い急性疾患にかかっている（ひどい風邪症状や胃腸炎症状など）



副反応が出ても2回目接種OK

4週間(28日)あけて

2回接種することで望ましい効果が得られます

1回目と2回目は同じ種類のワクチンを接種

2回目は接種できません  
1回目のワクチン接種でアナフィラキシー

接種2回目

4週間あけて  
2回目の接種  
2回目も同じ箇所  
に打つことに問題なし

接種当日と翌日は  
可能なら予定を  
空けておくのが  
おすすめ

接種後  
に2回目

接種後  
に2回目

感染対策は今まで同様

接種後

感染対策は  
今まで同様  
継続を

接種後も感染対策を。

- 何年も効果が持続するのかはまだ不明
- 多くの人がワクチン接種完了するまで時間がかかる
- 接種後も従来の感染対策（マスク、人混みを避ける、ソーシャルディスタンスなど）を継続しましょう。

接種  
当日

ワクチン接種

接種後待機

アレルギー  
15分アレルギー  
30分アレルギー  
なし  
15分待機  
あり30分待機接種後  
当日

OK!

X

- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール摂取は控える

新型コロナワクチンは「筋肉注射」。

肩の筋肉に、垂直に接種します。

一般的に筋肉注射は皮下注射より痛くないとされています。  
腫れや赤みも出にくく、免疫は付きやすいです。



1回目で副反応が出ても2回目接種は可能。

アナフィラキシーなど重い症状でなければ、2回目接種は可能です。  
必ずしも次も同じ症状が出るわけではありません。  
また、副反応予防のためにあらかじめ解熱剤など服用することは推奨されていません。

愛媛県・ワクチン接種後の相談窓口

(副反応・忌避事項などについて)

TEL : 0120-567-231 土日祝含む 24時間受付  
FAX : 050-3852-3213 平日 9:00~17:00

接種の予約・手続きの方法など  
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談  
かかりつけ医

参考となるWEB  
厚生労働省  
新型コロナワクチン  
についてのQ&A



こびナビ

新型コロナウイルス感染症や  
そのワクチンに関する正確な  
情報提供プロジェクト  
(医師が中心となって運営)

「コロワくんの相談室」  
チャットボット

ワクチンに関するよくある質問に答える  
LINEのチャットボットを利用した情報  
提供(医師が中心となって運営)

ワクチンの効果って？

(モデルナ社)

- 重症化予防効果あり
- 高齢者への有効性も高い
- 人にうつす可能性を減らす効果が期待されている

発症予防効果  
94%発症するリスクが  
約1/20


未接種 100  
接種 6  
100人中94人に効く  
という意味ではなく  
接種した人の発症率が  
接種しなかった人の  
発症率より94%少ない  
という意味。

他の  
ワクチン  
だら…  
麻疹  
ワクチン  
95%

インフルエンザ  
ワクチン  
50%

新型コロナワクチンは非常に効果が高いワクチンです

いつから効くの？



1回目を接種して2週間経ってから  
効果が出始めます。2回目を接種して14日目以降から  
十分な効果ができるとされています。

なお、一度新型コロナウイルスに感染した人も、ワクチン  
に比べて得られた免疫は弱い可能性があるため、接種する  
ことが望ましいです。



# ワクチンの副反応って?



新型コロナワクチン（モデルナ社）接種後の副反応の出現頻度

副反応はワクチン接種が原因で起こる反応のことです。

頻度は日本人が特に多いということはありません。1回目より2回目接種後により強く起こりやすいですが、十分な免疫をつけるには2回接種が望ましいとされています。また、このワクチンを接種しても人の遺伝子に影響が出ることはありません。

**いつ出る？**  
主な副反応は通常1～2日で出現し、3日以内に改善することが多いです。  
接種後1週間ほどしてから（他の副反応より遅めのタイミングで）  
腕が赤く腫れることがあり、この反応は平均4～5日で改善します。  
特に2回目接種後は発熱を含めた副反応が起きやすいので、  
接種当日と翌日は、可能なら予定を空けておくことをおすすめします。

主な副反応	
● 接種時の痛み	
● だるさ	
● 頭痛	
● 筋肉痛	1～2日後に 出ることがある
● 寒気	
● 発熱	
● 接種部位の腫れ	
● 関節痛	
● 吐き気	

**どんな症状？**  
主に接種部位の痛み・腫れ・だるさ・頭痛・筋肉痛・発熱などがあり、発熱以外に悪寒や関節痛が出る場合も。接種直後の痛みはそれほど強くありません。  
発熱時は解熱剤を使っても構いません（ワクチンの効果は下がりません）。  
解熱剤はアセトアミノフェンを含むものがおすすめです。

## 体調が回復しない場合は？

咳やのどの痛み、息切れなどの症状が見られたら  
上気道炎（風邪）や新型コロナウイルス感染症等の可能性も。  
(これらがワクチンの副反応で通常見られないため)

こんな時は医療機関に相談

- 接種後2日以上経っても解熱しない
- 症状が重い

# アナフィラキシー？

簡単に言うと「重いアレルギー反応」のことです。  
ワクチン接種などの後、短時間で以下の2つ以上の症状が出現する場合を「アナフィラキシー」といいます。  
新型コロナワイルスワクチンで起こる頻度は35万接種に1回で、  
70%が15分以内、90%が30分以内に起こるとされます。

- 皮膚・粘膜症状（発疹、発赤、かゆみ）
- 消化器症状（腹痛、嘔吐）
- 循環器症状（血圧低下・意識障害）
- 呼吸器症状（呼吸が苦しい、呼吸をするときにゼイゼイするなど）

90%が30分以内に  
起こると言われています

多いのは  
皮膚・粘膜症状  
(80～90%)



## アナフィラキシーショックって？

アナフィラキシーのうち血圧低下や意識レベル低下を伴うもの。

## アナフィラキシーは治療できます

治療により回復し、後遺症は残りません。

こんな場合接種できるの？



接種
<b>当日の発熱</b>
<b>重い急性疾患</b>
<b>他のワクチンを2週間以内に接種</b>
<b>アレルギー</b>
<b>花粉症</b>
<b>基礎疾患</b>
<b>妊娠中</b>
<b>授乳中</b>
<b>12歳未満</b>
<b>薬を内服中</b>
<b>…抗凝固薬</b>
<b>手術後</b>
<b>1回目の接種後副反応が出た</b>
<b>1回目の接種後アナフィラキシー</b>

参考

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389>  
[忽那賀志 \(https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunashatoshi/20210120-00217893/\)](https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunashatoshi/20210120-00217893/)  
CDC, Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States

CDC.Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Questions  
ACIP, COVID-19 vaccine safety update, January 27, 2021  
CDC, Interim Clinical Considerations for Use of mRNA COVID-19 Vaccines Currently Authorized in the United States 厚生労働省 新型コロナワクチンについてのQ&A